

Croton eluteria

synonyma: *Cascarilla officinalis*, *Clutia cascarilla*, *Clutia decandra*, *Clutia eluteria*, *Croton cascarilla*, *Croton cascarilloides*, *Croton eluteria*, *C. subsp. homolepidus*, *Croton homolepidus*, *Croton rosmarinifolius*, *Oxydectes cascarilla*, *Oxydectes cascarilloides*, *Oxydectes eluteria*, *Oxydectes homolepida*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Florida, Karibik, Texas

Roste v USA a Bahamských ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 4m. Vydává kořeněné aroma. Větve jsou v mládí rezavě šupinaté. Palisty brzy opadávají. Listy jsou vejčitékopinaté, celokrajné nebo vykousávané, přišpičatělé, dlouhé 3,2 - 7,6cm, široké 1,2 - 1,6cm, báze kulatá, spodní strana stříbřitě šupinatá a řapíky jsou dlouhé. Květenstvím je hrozen délky 3,7 - 5cm, samičí květy jsou bílé, na okraji ochlupené a samčí květy 10 - 12 tyčinek. Plodem je tobolka obsahující semena délky 8mm a šířky 6mm.

<https://www.rostliny.net/>