

Croton punctatus

synonyma: *Croton disjunctiflorus*, *Croton furfuraceus*, *Croton maritimus*, *Croton plukenetii*, *Drepanidium maritimum*, *Gynamblosis maritima*, *Hendecandra maritima*, *Lasiocroton prunifolius*, *Oxydectes maritima*, *Oxydectes punctata*, *Rottlera punctata*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kuba, Louisiana, Mississippi, Panama, Pennsylvania, Severní Karolína, Texas

Roste od USA po Panamu v podobě poléhavého až vzpřímeného polokeře. Dorůstá výšky do 1m. Stonek je v mládí ochlupený, později hnědý až černý. Palisty chybí. Listy jsou vejčité, tupě zakulacené, ochlupené, dlouhé 1,8 - 4,5cm, široké 1 - 2,8cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou silné. Květenstvím je oboupohlavný hrozen délky 1 - 4cm na až 1,4cm stopce, samičí květy vyrůstají samostatně nebo v párech, mají max. 1mm stopku, délku 4mm, 5 kališních lístků dlouhých do 3,5mm, samčí květy vyrůstají po 4 - 7ks, mají 5 kališních lístků o délce 2,5mm, korunní lístky chybí a mají 10 - 12 tyčinek. Plodem je zploštělá kulovitá tobolka délky 5mm, průměru 0,8 - 1cm obsahující semena délky 4 - 6mm.

<https://www.rostliny.net/>