

Echinodorus berteroi

synonyma: *Alisma berterioanum*, *Alisma berteroi*, *Alisma macrophyllum* var. *minus*, *Alisma rostratum*, *Alisma sprengelii*, *E. subsp. patagonicus*, *E. var. lanceolatus*, *E. var. patagonicus*, *Echinodorus cordifolius* f. *lanceolatus*, *Echinodorus cordifolius* var. *berterioanus*, *Echinodorus cordifolius* var. *lanceolatus*, *Echinodorus longilineatus*, *Echinodorus patagonicus*, *Echinodorus radicans*, *Echinodorus rostratus*, *Echinodorus rostratus* f. *lanceolatus*, *Echinodorus rostratus* var. *lanceolatus*, *Sagittaria rostrata*

čeleď: Alismataceae

oblasti: Argentina, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Portoriko, Tennessee, Texas, Utah

Roste v USA, střední Americe a na jih po Argentinu. Listy mají variabilní tvar, jsou dlouhé 10 - 45cm, široké 0,5 - 4cm, čárkovité až úzce eliptické, bledězelené a řapíkaté. Květenství se objevuje na 6 - 10cm stonku, vlastní květy mají bílou korunu o průměru 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>