

Dendrotrophe

čeleď: Santalaceae

Jedná se o dřevitou poloparazitickou liánu ze severu Austrálie a jihovýchodní Asie. Listy jsou střídavé, kožovité, řapíkaté nebo přisedlé. Kvete malými nazelenalými jednopohlavnými (samičí bývají mírně větší) nebo oboupohlavnými samostatnými nebo svazčitými zpravidla přisedlými květy. Plody jsou černé a dlouhé 1cm.

Dendrotrophe amorphia

Dendrotrophe buxifolia

synonyma: *D. buxifolia* var. *multinervis*, *Henslowia buxifolia*, *Osyris rotundata*

oblasti: Indonésie, Kambodža, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Kambodži, Indonésii, Vietnamu, Malajsii a Thajsku v podobě polovzpřímeného keře nebo popínavé dřeviny. Dorůstá výšky 3m. Větve jsou v mládí žlutozelené, později hnědé a zkroucené. Listy jsou eliptické, obvejčité nebo lžičkovité, tupé až mírně špičaté, dlouhé 2,2 - 4,5cm, široké 1,5 - 2,5cm, žilnatina má 3 žilky a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Kvete žlutozelenými oboupohlavnými květy ve 2 - 5tičetných svazečcích na 2 - 4mm stopce, listeny jsou kulaté, listence malé, eliptické a mají 5 laloků. Plody jsou kulaté, tmavěčervené až černé, lesklé a v průměru mají 3mm.

Dendrotrophe granulata

synonyma: *Dufrenoya granulata*, *Henslowia granulata*, *Henslowia granulata* var. *sikkimensis*

oblasti: Bhútán, Nepál, Sikkim, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Bhútánu, Indii a Nepálu v podobě dřevnaté popínavé dřeviny. Větve jsou vzpřímené, šedohnědé a hrbolkaté. Listy jsou vejčité, tupé až prakticky kulaté, podvinuté, lesklé, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 1,6 - 4cm, báze klínovitá až kulatá, spodní strana bledězelená, bazálních žilek je 5 - 7ks a řapíky jsou mírně křídlaté. Kvete jednopohlavnými vejčitými přisedlými květy, samčí ve svazečcích či okolících, samičí samostatně či v párech, mají 4mm stopku, listeny vejčité, dlouhé 1mm a listence vejčité. Plody jsou vejčité, hnědočervené a dlouhé 4 - 6mm.

Dendrotrophe platyphylla

synonyma: *D. heterantha*, *Dufrenoya heterantha*, *Dufrenoya platyphylla*, *Henslowia heterantha*, *Viscum heteranthum*, *Viscum platyphyllum*

oblasti: Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Yunnan

Roste v Číně, Malajsii, Myanmaru, Nepálu a Indii v podobě dřevnaté popínavky. Dorůstá výšky 2m. Větve mohou být zkroucené, zpravidla jemně hrbolaté. Listy jsou variabilní, mírně obvejčité, tupé, lesklé, mírně hrbolaté, dlouhé 2 - 2,7cm, široké 1,3 - 2cm, báze má 7 - 9 žilek a plynule přechází v úzce okřídlený řapík. Květy jsou vejčité, dlouhé 1,8mm, samostatné nebo svazčité (samčí 5 -

6tičetné, samičí samostatné či 3 - 4četné) na 3 - 6mm stopce, listeny jsou vejčité a listence eliptické. Plody jsou červené až oranžové, mírně eliptické a v průměru mají 4mm.

Dendrotrophe polyneura

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě dřevnaté popínavky. Větve mají délku 30 - 40cm a jsou drobně hrbolaté. Listy jsou variabilní, obvejčité až kulovité, tupé, dlouhé 2 - 4,5cm, široké 2 - 3,5cm, báze klínovitá s 7 - 9ti žilkami a řapíky jsou zploštělé, dlouhé 5 - 7mm. Kvete jednopohlavnými květy, samčí v 6tičetných svazečcích na až 1mm stopce, samičí květy jsou žluté, seskupené v 1 - 5tičetných svazečcích na 1 - 1,5mm stopce, listence jsou vejčité, dlouhé 2mm. Plody jsou vejčité, žluté a dlouhé 4mm.

Dendrotrophe umbellata

synonyma: *D. monticola*, *Henslowia umbellata*, *Thesium spathulatum*, *Viscum umbellatum*

oblasti: Hainan, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Yunnan

Patří mezi dřevnaté dvoudomé popínavé dřeviny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *longifolia*/*Henslowia umbellata* var. *longifolia* - Yunnan, Kambodža; listy kopinaté, dlouhé 8 - 11cm, široké 3 - 4cm, řapíky dlouhé 6 - 10cm

- var. *umbellata* - Hainan, Kambodža, Laos, Malajsie, Indonésie; dřevnatá popínavka; větve v mládí 4hranné, později kulaté, světlehnědé; listy mírně kožovité, obvejčité až lžičkovité, kulaté či tupé, lesklé, báze m 3 žilky a plynule přechází v řapík o délce 4 - 6mm; květy jednopohlavné, v průměru mají 1mm, samčí seskupené v 3 - 5tičetných okolících na 5 - 7mm stopce, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, trubku s 5ti laloky, samičí květy vyrůstají v 1 - 3četných svazečcích a stopku mají dlouhé 1,5 - 2mm; plody obvejčité, tmavěčervené až černé, dlouhé 1cm

Dendrotrophe varians

synonyma: *D. buxifolia* var. *minor*, *D. cassiifolia*, *D. frutescens*, *D. frutescens* var. *subquinquenervia*, *D. lobbiana*, *D. minor*, *D. palawanensis*, *D. philippinensis*, *D. punctata*, *D. ridleyi*, *D. spicata*, *D. varians* var. *arfakensis*, *D. varians* var. *gracilior*, *D. varians* var. *minor*, *D. varians* var. *multinervis*, *D. wrayi*, *Exocarpos amboinensis*, *Henslowia frutescens*, *Henslowia frutescens* var. *subquinquenervia*, *Henslowia palawanensis*, *Henslowia sessiliflora*, *Henslowia varians*

oblasti: Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keřovité popínavé poloparazitické dřeviny. Dorůstá délky 2 - 8m. Větve jsou v mládí žlutozelené, později načernalé, 3hranné a zkroucené. Listy jsou kožovité, mírně obvejčité, tupé, dlouhé 3 - 7cm, široké 2 - 5cm, na bázi mají 3 - 5 žilek a přechází v řapík o délce 0,5 - 1cm. Kvete zpravidla jednopohlavnými květy, samčí jsou seskupené v 5 - 6tičetných okolících, v průměru mají 2mm, stopku délky 1,5mm, samičí a oboupohlavné květy vyrůstají zpravidla samostatně. Plody jsou vejčité, hnědočervené a dlouhé 1 - 1,2cm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3667>

<https://www.rostliny.net/>