

## Nectandra cissiflora

synonyma: *Nectandra capanahuensis*, *Nectandra kaburiensis*, *Nectandra kuntzeana*, *Nectandra myriantha*, *Nectandra myriantha* var. *attenuata*, *Nectandra myriantha* var. *glabrata*, *Nectandra paulii*, *Nectandra steinbachii*, *Nectandra surinamensis*

čeleď: Lauraceae

oblasti: Brazílie, Mexiko, Peru

Roste od Mexika po Peru a Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 30m při průměru kmene do 30cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, mírně svazčité, kožovité, eliptické až mírně obvejčité, podvinuté, zakulacené nebo krátce špičaté, dlouhé 9 - 24cm, široké 4 - 9cm, báze tupá až špičatá, sbíhavá v řapík délky 1,1 - 2,8cm, spodní strana ochlupená a žilnatinu tvoří 6 - 11 párů žilek. Květenství je latnaté, mírně ochlupené, dlouhé 12 - 25cm, má až 11cm stopku, vlastní květy bílé, ochlupené, mají 1 - 5mm stopku a mají šířku 4 - 6mm. Plodem je kulovitá černá bobule o průměru 1,3 - 2cm.

<https://www.rostliny.net/>