

Ocotea floribunda

synonyma: Calycodaphne cupularis, Calycodaphne dysoxylon, Calycodaphne floribunda, Laurus floribunda, Nectandra floribunda, Ocotea wachenheimii, Oreodaphne floribunda, Persea floribunda, Strychnodaphne floribunda

čeleď: Lauraceae

oblasti: Francouzská Guyana, Guyana, Nikaragua, Peru, Portoriko, Venezuela

Roste od karibiku po sever Jižní Ameriky v podobě dvoudomého stromu. Dorůstá výšky 15 - 30m při průměru kmene 30 - 80cm. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou střídavé až prakticky vstřícné, mírně eliptické až obvejčité, špičaté, dlouhé 7 - 19cm, široké 2 - 8cm, báze špičatá až klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,4cm. Květenství je latnaté až hroznovité, dlouhé 3 - 14cm, má 1 - 4cm stopku, vlastní květy jsou jednopohlavné, zelené až světle béžové, široké 5 - 7mm a mají 1 - 3mm stopku. Plodem je kulovitá zelená nasivělá bobule délky 1,3 - 1,8cm, šířky 1 - 1,5cm a číška je plochá o průměru 0,6 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>