

Hyparrhenia hirta (Vousatice chlupatá)

synonyma: Andropogon ambiguus, Andropogon collinus, Andropogon dalmaticus, Andropogon giganteus, Andropogon hirtus, Andropogon hirtus subsp. pubescens, Andropogon hirtus var. glabriglumis, Andropogon hirtus var. glaucus, Andropogon hirtus var. podotrichus, Andropogon hirtus var. velutinus, Andropogon modicus, Andropogon pichleri, Andropogon pilosus, Andropogon podotrichus, Andropogon pubescens, Andropogon sinaicus, Andropogon transvaalensis, Cymbopogon hirtus, Cymbopogon hirtus subsp. villosus, Cymbopogon modicus, Cymbopogon pubescens, Cymbopogon transvaalensis, Heteropogon hirtus, Heteropogon pubescens, H. f. podotricha, H. f. pubescens, H. subsp. pubescens, H. subsp. villosa, H. var. longiaristata, H. var. podotricha, H. var. pubescens, Hyparrhenia modica, Hyparrhenia podotricha, Hyparrhenia pubescens, Hyparrhenia sinaica, Sorghum hirtum, Trachypogon hirtus, Trachypogon pubescens

čeleď: Poaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arabský poloostrov, Austrálie, Baleáry, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Havajské ostrovy, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Jordánsko, Kalifornie, Kapsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Střední Amerika, Sýrie, Texas, Tunisko, Turecko

Roste v Africe, jižní Evropě, Asii jako trvalka, zavlečená byla do Austrálie, Severní a Jižní Ameriky. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1m. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Listy jsou úzce čárkovité, dlouhé 2 - 15 (i 30)cm a široké 1 - 2 (i 4)mm. Kvete na 0,3 - 0,6 (i 1)m stonku v latě s délkou do 30cm a složenou s 2 - 10ti páry 8 - 13 (i 16)tičetných hroznů délky 2 - 4cm, klásky jsou přisedlé, bíle ochlupené a dlouhé 4 - 6,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. pubescens
- subsp. villosa

Vyhovují ji suchá místa v těžké půdě i na skalách či erodovaných půdách.

<https://www.rostliny.net/>