

Andryala integrifolia (Andryala vlnatá)

synonyma: *Andryala allochroa*, *Andryala corymbosa*, *Andryala diffusa*, *Andryala dissecta*, *Andryala gracilis*, *Andryala humilis*, *A. var. angustifolia*, *A. var. corymbosa*, *A. var. floccosa*, *A. var. gracilis*, *A. var. nigricans*, *A. var. sinuata*, *Andryala minuta*, *Andryala mollis*, *Andryala parviflora*, *Andryala parviflora var. latifolia*, *Andryala reboudiana*, *Andryala runcinata*, *Andryala sinuata*, *Andryala undulata*, *Andryala uniflora*, *Andryala variifolia*, *Rothia cheiranthifolia*, *Rothia lanata*, *Rothia runcinata*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozeří, Kanárských ostrovech a Madeiře. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 1m. Listy jsou střídavé, peřenosečné až peřenolaločné. Květenstvím je úbor, zákrov je válcovitý, dlouhý 0,6 - 1,1cm a široký 5 - 9mm. Plodem je nažka délky 1 - 1,8mm s chmýrem délky 4 - 6mm.

<https://www.rostliny.net/>