

Reseda luteola (Rýt barvířský)

čeleď: Resedaceae

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Maryland, Massachusetts, Missouri, Německo, New York, Nové Skotsko, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Rhode Island, Středozemí, Švýcarsko, Washington

Roste ve středozemí jako dvouletka. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1,5 (i 2)m na přímé i větvené lodyze se žebry. Listy mají úzce kopinatý tvar, bazální jsou dlouhé 5 - 15cm a široké 0,5 - 2,5cm. Kvete nažloutlými květy s kališními lístky délky 1 - 2,5mm a se 4mi korunními lístky v hustém hroznu na konci lodyhy. Plodem je tobolka délky 3 - 5mm, šířky 4 - 6mm a semena jsou dlouhé 0,7 - 1mm. Z nati bylo vyráběno žluté barvivo. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. biaui

Vyhovují mu půdy rumištního typu, okraje cest, štěrkové náplavy, atp. a plné slunce.

<https://www.rostliny.net/>