

Paederia foetida

synonyma: *Apocynum foetidum*, *Crawfordia paniculata*, *Gentiana scandens*, *Hondbesseion foetidum*, *Hondbesseion tomentosum*, *Paederia amboinensis*, *Paederia barbulata*, *Paederia chinensis*, *Paederia chinensis* f. *microphylla*, *Paederia chinensis* f. *tenuissima*, *Paederia chinensis* var. *angustifolia*, *Paederia chinensis* var. *maritima*, *Paederia chinensis* var. *megaphylla*, *Paederia chinensis* var. *velutina*, *Paederia corymbosa*, *Paederia dunniana*, *Paederia esquirolii*, *P.* f. *microphylla*, *P.* var. *sessiliflora*, *Paederia laxiflora*, *Paederia longituba*, *Paederia magnifolia*, *Paederia mairei*, *Paederia ovata*, *Paederia prainii*, *Paederia scaberula*, *Paederia scandens*, *Paederia scandens* f. *mairei*, *Paederia scandens* f. *megaphylla*, *Paederia scandens* f. *microphylla*, *Paederia scandens* f. *rubescens*, *Paederia scandens* f. *rubrae-stellaris*, *Paederia scandens* var. *longituba*, *Paederia scandens* var. *mairei*, *Paederia scandens* var. *maritima*, *Paederia scandens* var. *tomentosa*, *Paederia scandens* var. *velutina*, *Paederia scandens* var. *villosa*, *Paederia sessiliflora*, *Paederia stenophylla*, *Paederia tomentosa*, *Paederia tomentosa* var. *glabra*, *Paederia tomentosa* var. *mairei*, *Paederia uraiensis*, *Paederia villosa*, *Psychotria volubilis*, *Reussia sarmentosa*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Anhui, Arunáčalpradéš, Ásám, Bangladéš, Bengálsko, Bhútán, Filipíny, Florida, Fujian, Gansu, Georgia, Guangdong, Guangxi, Hainan, Havajské ostrovy, Hubei, Hunan, Indonésie, Japonsko, J Korea, Jiangsu, Jiangxi, Jižní Karolína, Kambodža, Laos, Louisiana, Malajsie, Manípur, Méghálaja, Melanésie, Mizóram, Myanmar (Barma), Nepál, S Japonsko, Severní Karolína, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Sikkim, Střední Indie, Střední Japonsko, Tchaj-wan, Texas, Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan, Zhejiang

Pochází z Asie. Roste v podobě popínavého keře. Dorůstá délky do 5m. Listy jsou vstřícné, vejčitékopinaté, špičaté, tmavězelené, celokrajné, dlouhé 5 - 12cm a báze je kulatá až mírně srdčitá. Květenstvím je terminální lata délky 20 - 40cm, vlastní květy jsou trubkovité, bílé, dlouhé 1,5cm a jícen je růžovofialový. Plody jsou žluté, oranžové až hnědočervené, kulaté a v průměru mají kolem 5mm. Využívá se v tradiční přírodní medicíně.

<https://www.rostliny.net/>