

Cyperus odoratus

synonyma: Cyperus acicularis, Cyperus eggersii, Cyperus engelmannii, Cyperus ferax, Cyperus ferruginescens, Cyperus longispicatus, Cyperus macrocephalus, Cyperus macrocephalus var. eggersii, C. var. engelmannii, C. var. squarrosus, Cyperus speciosus, Cyperus speciosus var. squarrosus, Mariscus huarmensis, Torulinium confertum, Torulinium eggersii, Torulinium odoratum

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Afrika, Alabama, Arizona, Arkansas, Asie, Austrálie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Vyskytuje se v tropech Severní, Jižní a střední Ameriky, Asii, Tichém oceánu, Austrálii a Afriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky až 50cm nebo i více. Plody jsou světlehnědé až červenohnědé. Plodem je nažka.

Vyhovuje mu vlhko a vysoká vzdušná vlhkost.

<https://www.rostliny.net/>