

## Cyperus squarrosus

synonyma: Cyperus aristatus, Cyperus inflexus

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Čína, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Indie, Iowa, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Madagaskar, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Vyskytuje se ve vlhkých oblastech celého světa jako jednoletka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 16 (i 20)cm. Stonek je ostře 3hranný, šedozelený a průměru 0,5 - 1,5mm. Vytváří pouze 1 - 3 bazální šedozelené kýlnaté špičaté listy délky do 10cm, šířky 1 - 3mm, pochva je načervenalá až žlutohnědá nebo zelená a dlouhá 0,7 - 5cm. Květenstvím je malý několikanásobný klas délky do 5cm, má max. 4 primární větve délky do 4,5cm, 2 - 3 listeny délky do 13cm, klásky jsou vejčité, dlouhé do 7mm a široké 2,5 - 3mm. Plodem ne obvejčitá 3hranná hnědá nažka délky 0,7 - 1mm.

<https://www.rostliny.net/>