

## Actaea spicata (Samorostlík klasnatý)

synonyma: *Actaea alba*, *Actaea corymbosa*, *Actaea densiflora*, *Actaea nigra*, *A. var. melanocarpa*, *A. var. nigra*, *Actaea vulgaris*, *Christophoriana spicata*, *Christophoriana vulgaris*

čeleď: Ranunculaceae

oblasti: Česká republika, Himálaj, Írán, Itálie, Katalánsko, Německo, Pákistán, Polsko, SZ Asie, Švýcarsko

Roste v Evropě a Asii v trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 30 - 60 (i 75)cm a šířky 45cm. Listy jsou 2 - 3x zpeřené, dlouhé 40cm, široké 30cm a při rozemnutí vydávají nepříjemný zápach. Kvete šedými až bílými květy se 4 - 6ti korunními lístky, vykvétají na až 10cm stopkatém vejčitém hroznu s až 1m lodyhou. Plodem je červenočerná kulatá bobule velikosti 1 - 1,1cm a jsou velmi jedovaté. Využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminata*/*A. acuminata* - jihozápadní Asie, Himálaj
- var. *alba* - bílé bobule
- var. *rubra* - červené bobule
- var. *spicata* - Evropa, severozápadní Asie

Vyhovují mu stinné lesy a křoviny.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>