

Racosperma williamsianum

čeleď: Fabaceae

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 2 - 8m. Borka je šedá až tmavě šedohnědá. Větve jsou v mládí hranaté, zploštělé až eliptické, žlutooranžové až hnědočervené. Palisty jsou párovité, 3úhlé a dlouhé 0,3 - 1mm. Fylodia na mladých exemplářích jsou eliptická až obvejčitá, mohou být mírně zahnutá, světlezelená až sivozelená, tupá, dlouhá 1,3 - 7,5cm, široká 1,3 - 2,5cm, na dospělých rostlinách jsou obkopynatá, čárkovitá nebo eliptická, (i mírně zahnutá), světlezelená až sivozelená, špičatá, hroditá, mohou být ochlupená, dlouhá 4,5 - 12cm a široká 0,4 - 1,1cm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý přisedlý klas délky 1,5 - 4cm, má 2 listeny délky 1,2 - 2,5mm, listence jsou dlouhé 0,8mm, vlastní květy jsou světležluté, 5tičetné, kalich má trubku délky 0,7 - 1,2mm a koruna má trubku délky 1 - 1,5mm. Plodem je čárkovitý zaškrcovaný lusk délky 3,5 - 9cm, šířky 2 - 4mm a obsahuje 6 - 12 eliptický tmavěhnědých až černých semen délky 0,6 - 1mm a šířky 0,3 - 0,6mm.

<https://www.rostliny.net/>