

Toxicoscordion

čeleď: Melanthiaceae

Roste na západě Severní Ameriky.

Množí se dělením silnějších trsů nebo semeny.

Toxicoscordion brevibracteatum

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv, Kalifornský záliv sever, Sonora

Roste v USA a Mexiku jako trvalka. Dorůstá výšky 50 - 60cm. Pod zemí vytváří hnědou až černou hlízu délky do 4cm. Listy jsou čárkovité, dlouhé do 30cm a převážně přízemní. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou samčí nebo oboupohlavné a mají 6 béžových korunních lístků. Plodem je tobolka délky 1 - 2cm.

Toxicoscordion exaltatum

oblasti: Kalifornie, Nevada, Sierra Nevada (USA)

Roste v USA.

Toxicoscordion fontanum

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Roste v USA. Pod zemí vytváří vejčitou hlízu délky do 4cm. Květenství může být až 100četné, vlastní květy mají béžové korunní lístky délky ydo 1,2cm.

Toxicoscordion fremontii

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv, Kalifornský záliv sever, Oregon

Roste v USA a Mexiku. Pod zemí vytváří hlízu o průměru 2 - 3,5cm. Listy dorůstají délky až 50cm. Květy jsou 6tičetné v průměru mají 1 - 4cm.

Toxicoscordion micranthum

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA. Pod zemí vytváří hlízu. Dorůstá výšky do 70cm. Květenství může být až 60tičetné, vlastní květy jsou béžové (i nazelenalé) a v průměru měří 0,5 - 1,2cm.

Toxicoscordion nuttallii

oblasti: Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas

Roste v USA. Dorůstá výšky do 75cm. Pod zemí vytváří hlízu. Květenství může být až 60tičetné, vlastní květy jsou béžové.

Toxicoscordion paniculatum

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA. Dorůstá výšky do 70cm. Pod zemí vytváří hnědou až černou hlízu délky do 5cm a průměru 3cm. Listy jsou čárkovité, dlouhé až 50cm a většinou jsou přízemní. Květenstvím je až 80tičetný hrozen, vlastní květy jsou z větší části oboupohlavné, 6tičetné, dlouhé 3 - 6mm a u báze žlutozelené. Plodem je tobolka délky 1 - 2cm.

Toxicoscordion venenosum

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA a Kanadě jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 70cm. Pod zemí vytváří vejčitou cibuli průměru 1 - 3cm. Lodyha je nevětvená. Listy jsou trávovité až čárkovité, dlouhé 10 - 50cm a široké 0,2 - 1cm. Květenství je řídké, vrcholové, hroznovité až latnaté, 10 - 50tikvěté, dlouhé 5 - 20cm, vlastní květy jsou zvonkovité, béžové, průměru 0,5 - 1cm, korunní lístky jsou dlouhé 2 - 5mm a široké 1 - 3mm. Plodem je tobolka délky 0,8 - 2cm. Je výrazně jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. gramineum
- var. venenosum

Vyhovují jí prairie, vlhké i suché louky, křoviny, okraje lesů nebo travnaté svahy.

<https://www.rostliny.net/>