

Nama

čeleď: Namaceae

Roste především v Severní Americe zpravidla jako jednoletka. Listy bývají řídké, obvykle střídavé, celokrajné (i zubaté). Kvete samostatnými květy nebo v terminálních či postranních vrcholících, korunní lístky bývají bílé až růzovofialové, trubkovité či nálevkovité, laloky kopinaté až čárkovité. Plodem je eliptická až vejčitá tobolka s mnoha hladkými nebo síťnatými semeny.

Vyhovují ji lehké štěrkovité nebo kamenité půdy.

Nama affine

Nama aretioides

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě jednoletky. Stonek dorůstá délky do 12cm. Povrch je ochlupený. Kvete bílými až růžovými trubkovitými květy. Plodem je tobolka délky několika mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aretioides
- var. californicum
- var. multiflorum

Nama biflora

Nama californica

Nama californicum

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA jako jednoletka. Povrch je ochlupený. Stonek dorůstá délky do 10cm. Listy jsou oválné, kopinaté až lžičkovité a ochlupené. Kvete zvonkovitými květy v odstínech růžové nebo bílé.

Nama carnosa

Nama carnosum

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Roste v USA.

Nama constancei

Nama corymbosa

Nama coulteri

Nama cuatrocienegensis

Nama demissa

Nama demissum

oblasti: Arizona, Kalifornie, Mexiko, Nevada, Utah

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka. Kvete růžovofialovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. covillei
- var. demissum

Nama densa

Nama densum

oblasti: Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA jako jednoletka. Stonek dorůstá délky do 10cm. Listy jsou kopinaté a dlouhé do 4cm. Kvete trubkovitými květy od bílé po růžovofialovou. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. densum
- var. parviflorum

Nama depressa

Nama depressum

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA jako jednoletka. Stonek dorůstá délky do 10cm. Listy jsou kopinaté až lžičkovité, dlouhé do 2cm. Kvete zvonkovitými květy od bílé po růžovofialovou.

Nama dichotoma

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA.

Nama ehrenbergii

Nama flavescens

Nama havardii

oblasti: Texas

Roste v USA.

Nama hintoniorum

Nama hirsuta

Nama hispida

Nama hispidum

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Maryland, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah

Roste v USA jako jednoletka.

Nama hitchcockii

Nama jamaicense

oblasti: Alabama, Florida, Jamajka, Jižní Karolína, Louisiana, Portoriko, Texas

Roste v USA a Karibiku.

Nama jamaicensis

Nama johnstonii

Nama linearis

Nama lobbii

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah

Roste v USA jako trvalka či polokeř. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou oválné až kopinaté, ochlupené, dlouhé 2 - 6cm. Kvete fialovými zvonkovitými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nama macrantha

Nama macranthum

Nama marshii

Nama organifolia

Nama orizabensis

Nama ovata

Nama palmeri

Nama parvifolia

Nama parvifolium

oblasti: Texas

Roste v USA.

Nama pringlei

Nama prostrata

Nama pueblensis

Nama purpusii

Nama pusilla

Nama pusillum

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada

Roste v USA jako jednoletka. Listy jsou tmavězelené (i načervenalé), ochlupené, vejčité až kopinaté a dlouhé do 1cm. Květy bílými až růžovými 5tičetnými květy o průměru 1 - 2mm.

Nama quadrivalvis

Nama quiexobrana

Nama retrorsa

Nama retrorsum

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Utah

Roste v USA.

Nama rothrockii

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Sierra Nevada (USA)

Roste v USA jako trvalka. Stonek je dlouhý do 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce kopinaté, dlouhé 2 - 5 (i 6)cm a na okraji pravidelně hrubě zvlněně zubaté. Květy mají trubkovitý tvar, délku 1 - 1,5cm a barvu růžovou, růžovofialovou nebo bleděmodrou.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nama rotundifolia

Nama sandwicensis

oblasti: Havajské ostrovy

Nama schaffneri

Nama segetalis

Nama sericea

Nama serpylloides

Nama spathulata

Nama stenocarpa

Nama stenocarpum

oblasti: Arizona, Kalifornie, Texas

Roste v USA jako jednoletka. Stonek dorůstá délky do 40cm. Listy jsou lžičkovité, dlouhé 3cm a ochlupené. Květy jsou bílé a zvonkovité.

Nama stenophylla

Nama stevensii

oblasti: Kansas, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Roste v USA.

Nama torynophylla

Nama torynophyllum

oblasti: Texas

Roste v USA.

Nama turneri

Nama undulata

Nama undulatum

oblasti: Texas

Roste v USA.

Nama xylopoda

Nama xylopodum

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Roste v USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou střídavé, obkopinaté až kopist'ovité, špičaté, mírně svinuté, ochlupené a dlouhé 0,5 - 2cm. Kvete samostatnými bílými trubkovitými květy o délce 6 - 8mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4250>

<http://skalnicky.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod>Nama.htm>

<https://www.rostliny.net/>