

Anagallis arvensis (Drchnička rolní)

synonyma: *Anagallis parviflora*, *Anagallis phoenicea*, *Anagallis platyphylla*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, S Afrika, Sardínie, Saskatchewan, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Texas, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Roste po celé severní polokouli jako jednoletka. Nedorůstá obvykle výšky více než 10cm, délka poléhavého nebo vystoupavého větvičího se stonku s čtvercovým průřezem je ale 5 - 50cm. Listy jsou vstřícné nebo v 3četných přeslenech, kopinaté až vejčité, dlouhé 0,5 - 2 (i 2,5)cm a široké 0,3 - 1,2 (i 1,5)cm. Kvete červenými nebo modrými (i růžovými, fialovými) 5tičetnými květy v paždí listů na stopce, kalich má laloky délky 3,5 - 4mm, koruna má v průměru (0,4 -) 0,8 - 1,2cm a laloky jsou obvejčité délky 4 - 5mm. Plodem je tobolka velikosti 4 - 5 (i 6)mm a obsahuje 3úhlá tmavěhnědá semena délky 1mm. Je jedovatá a využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *arvensis* (Drchnička rolní pravá)
- var. *caerulea* - květy tmavěmodré
- subsp. *foemina*
- var. *pallida*
- var. *parviflora*

Vyhovují jí spíše písčité hlinité půdy na polích, zahradách, vinicích, atp. s teplým klimatem. U nás je považována za plevel.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>