

# Rhynchanthera (Zobour)

čeleď: Melastomataceae

Většina druhů pochází z tropické Jižní Ameriky, od Mexika po Paraguay. Roste v podobě keře nebo polokeře (i byliny). Povrch bývá žláznatě ochlupený. Dorůstá výšky do 3m. Stonky mohou být 4hranné. Listy jsou vstřícné, pilovité, zpravidla žláznatě ochlupené, čárkovité, vejčité až eliptické s 3 - 9ti souběžnými nervy a přisedlé nebo řapíkaté. Květenstvím je terminální kytice nebo lata, vlastní květy jsou velké, 5tičetné, češule zvonkovitá, kališní cípy čárkovité nebo šídlovité, korunní lístky jsou obvejčité, růžovofialovočervené (i bílé), mají 10 různě dlouhých tyčinek a 5 z toho jsou sterilní. Plodem je ochlupená až štětinatá (i žláznatě) vejčitá, eliptická nebo zvonkovitá tobolka obsahující drobná vejčitá nebo eliptická semena. Nejznámějším druhem je *R. grandiflora*.





### Rhynchanthera acuminata

### Rhynchanthera apurensis

### Rhynchanthera brachyrhyncha

### Rhynchanthera bracteata

### Rhynchanthera cordata

### Rhynchanthera dichotoma

oblasti: Guyana, J Brazílie, Kolumbie, Peru, Střední Brazílie, Venezuela

Roste od severu Jižní Ameriky po jižní Brazílii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Povrch je žláznatě ochlupený. Listy jsou vejčité, špičaté, na okraji ochlupené, dlouhé 5 - 10cm, široké 2 - 7cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Květenstvím je vrcholík, květy mají 1mm stopku, kališní cípy délky 2 - 4 tvaru úzce 3úhlého až šídlovitého a korunní lístky jsou dlouhé 0,7 - 1,2cm. Plodem je kulovitá tobolka o šířce do 6mm.

### Rhynchanthera gardneri

### Rhynchanthera grandiflora

oblasti: Amazonas, Bolívie, Francouzská Guyana, J Mexiko, Panama, Střední Brazílie, Venezuela

Roste od Mexika po Brazílii a Bolívii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,2 (i 2)m. Povrch je žláznatě ochlupený. Kmínky jsou mírně 4hranné. Listy jsou pilovité, eliptické až mírně kopinaté nebo vejčité, špičaté, oboustranně jemně ochlupené, dlouhé 4,5 - 8 (i 10)cm, široké 2,5 - 3 (i 4,5)cm, báze je srdčitá, má 7 - 9 žilek a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 3,7cm. Květenstvím je vrcholík, listeny přisedlé, květy mají 1mm stopku, kališní cípy jsou šídlovité nebo až nitkovité, žláznatě ochlupené, mají osinu, délku 0,5 - 1,5cm, korunní lístky jsou růžové až fialové, obvejčité, tupé až zakulacené a dlouhé 2 - 2,5cm. Plodem je kulovitá tobolka o průměru 4mm a délce 6 - 7mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. monodynamia

Vyhovují mu okraje vodních ploch nebo potoků v prostředí savany.

## Rhynchanthera hassleriana

## Rhynchanthera hispida

oblasti: S Brazílie, Střední Brazílie, Surinam

Roste v Surinamu a Brazílii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 7 - 9cm, široké 3 - 7cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenství je ochlupené, vlastní květy mají 1mm stopku, kališní cípy 3úhlé, dlouhé 3 - 5mm a korunní lístky jsou dlouhé 1,3cm.

## Rhynchanthera latifolia

## Rhynchanthera mexicana

oblasti: Mexiko

## Rhynchanthera novemnervia

## Rhynchanthera paludicola

## Rhynchanthera rosea

## Rhynchanthera serrulata

oblasti: Guyana, Kolumbie, S Brazílie, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Guyaně a Brazílii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 50 - 80cm. Povrch je řídky žláznatě ochlupený. Listy jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 1,7 - 7cm, široké 2 - 7mm, mají 3 - 5 žilek a řapík je dlouhý max. 8mm. Květy mají 1mm stopku, kališní cípy délky 5 - 8mm, korunní lístky jsou úzce 3úhlé a dlouhé 1,2 - 1,5cm.

## Rhynchanthera ternata

## Rhynchanthera ursina

## Rhynchanthera verbenoides

Další informace:

<http://botany.cz/cs/rhynchanthera-grandiflora/>

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2939>

<https://www.rostliny.net/>