

Rhynchanthera grandiflora

čeleď: Melastomataceae

oblasti: Amazonas, Bolívie, Francouzská Guyana, J Mexiko, Panama, Střední Brazílie, Venezuela

Roste od Mexika po Brazílii a Bolívii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,2 (i 2)m. Povrch je žláznatě ochlupený. Kmínky jsou mírně 4hranné. Listy jsou pilovité, eliptické až mírně kopinaté nebo vejčité, špičaté, oboustranně jemně ochlupené, dlouhé 4,5 - 8 (i 10)cm, široké 2,5 - 3 (i 4,5)cm, báze je srdčitá, má 7 - 9 žilek a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 3,7cm. Květenstvím je vrcholík, listeny přisedlé, květy mají 1mm stopku, kališní cípy jsou šídlovité nebo až nitkovité, žláznatě ochlupené, mají osinu, délku 0,5 - 1,5cm, korunní lístky jsou růžové až fialové, obvejčité, tupé až zakulacené a dlouhé 2 - 2,5cm. Plodem je kulovitá tobolka o průměru 4mm a délce 6 - 7mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. monodynamia

Vyhovují mu okraje vodních ploch nebo potoků v prostředí savany.

<https://www.rostliny.net/>