

Anthriscus caucalis (Kerblík obecný)

synonyma: *Anthriscus anthriscus*, *A. var. gymnocarpa*, *A. var. neglecta*, *Anthriscus neglecta*, *Anthriscus scandicina*, *Anthriscus scandicinus*, *Anthriscus vulgaris var. baeticum*, *Anthriscus vulgaris var. crassus*, *Anthriscus vulgaris var. gymnocarpa*, *Anthriscus fetidus*, *Caucalis scandicina*, *Caucalis scandix*, *Cerofolium anthriscus*, *Cerofolium vulgare*, *Chaerofolium anthriscus*, *Chaerophyllum anthriscus*, *Scandix anthriscus*, *Torilis anthriscus*

čeleď: *Apiaceae*

oblasti: Andalusie, Arizona, Arkansas, Atlas, Britská Kolumbie, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, J Švédsko, Jižní Karolína, Kalifornie, Karpaty, Katalánsko, Kypr, Louisiana, Makaronésie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Missouri, Nebraska, Německo, New York, Nový Zéland, Ohio, Ohňová země, Oklahoma, Ontario, Oregon, Polsko, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Virginie, Washington, Wyoming, Zakavkazsko, Západní Virginie

Pochází z Evropy a Asie, ale zalečen byl i jinde. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 60 (i 80)cm. Lodyha je přímá nebo vysoupavá a lysá. Zpeřené listy mají zelenou barvu, celkově trojúhelníkového tvaru a jsou 2 - 3 zpeřené, dlouhé 6 - 15cm, široké 3 - 10cm, vlastní lístečky jsou vejčité až dlouze vejčité, peřenosečné s tupě zubatými úkrojky. Kvete zelenobílými květy v 3 - 5tičetném okolíku na lysé stopce. Okolíčky mají obvykle 5 květů. Plodem je vejčitá až kuželovitá 2nažka délky 3 - 5mm, je zakončená zobánkem a plodní stopka je štětinatá. Je jedovatý. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují mu křoviny, akátiny, vinice, okraje plotů a teplo.

<https://www.rostliny.net/>