

Hernandia nymphaeifolia (Stukač leknínolistý)

čeleď: Hernandiaceae

oblasti: Filipíny, Indie, Indonésie, J Čína, JV Čína, Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Papua-Nová Guinea, S Austrálie, Srí Lanka, Tchaj-wan, Tichý oceán, V Afrika

Roste v Africe, Indii, Tchaj-wanu, Malajsii, Papuásii v podobě stromu. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 22m při průměru kmene do 90cm. Borka je šedá a hladká. Listy jsou střídavé, štítnaté, vejčité až srdčité, špičaté, papírovité až mírně kožovité, lesklé, dlouhé 8 - 40cm, široké 5 - 33cm, báze zakulacená, žilnatina dlanitá, 5 - 9tičetná, řapík má délku 5 - 17 a nasedá na list 0,5 - 3cm od báze. Květenstvím je bohatý vrcholík délky do 30cm včetně stopky s délkou do 20cm, květy jsou bílé až nažloutlé, samčí 3četné na 4 - 4,5mm stopce, korunní lístky dlouhé 5mm, samičí 4četné, přisedlé a korunní lístky dlouhé 5mm. Plody jsou růžové až nažloutlé, částečně průsvitné, vejčité až eliptické, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 1,5 - 3,5cm, obsahují 1 semeno a obklopuje je voskovitá červená nebo bílá číška.

Vyhovují ji tropické lesy s lehkou písčitou půdou, zpravidla v blízkosti mokřadu.

<https://www.rostliny.net/>