

Horsfieldia tuberculata

čeleď: Myristicaceae

oblasti: Melanésie, Papua-Nová Guinea, Tichý oceán

Roste na Šalamounových a Karolínských ostrovech a Papui-Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté, dlouhé 12 - 40cm, široké 3 - 16cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 11 - 22 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,8cm. Květenství je ochlupené, samčí 1 - 3x větvené, dlouhé 3 - 22cm, široké 2 - 10cm, má 0,5 - 2,5cm stopku, květy mají 2 - 6mm stopku; samičí květenství dlouhé do 7cm, listeny opadavé, dlouhé 0,5 - 3mm, květy vyrůstají po 1 - 4ks, obal je 2 - 3laločný a květy mají 1,5 - 2,5mm stopku. Plodenství je 5 - 15tičetné, plody eliptické, dlouhé 1,5 - 3,7cm a široké 1,1 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *crassivalva* - Šalamounovy ostrovy, Papua-Nová Guinea; větve v mládí tlusté 3 - 5mm; listy dlouhé 25 - 35cm, široké 10 - 13cm; samčí květy mají 3 - 6mm stopku; plody dlouhé 2,7 - 3,7cm, široké 1,7 - 3cm

- var. *tuberculata*/H. *novo-guineensis* var. *moseleyana*/H. *solomonensis*/Myristica *tuberculata* - Šalamounovy ostrovy, Karolíny, Papua-Nová Guinea; větve v mládí tlusté 2 - 6mm; listy dlouhé 12 - 40cm, široké 3 - 16cm; samčí květy mají 2 - 6mm stopku; plody dlouhé 1,5 - 2,5cm a široké 1 - 1,5cm

<https://www.rostliny.net/>