

Atriplex patula (Lebeda rozkladitá)

synonyma: *Atriplex agrestis*, *Atriplex amana*, *Atriplex angustifolia*, *Atriplex erecta*, *Atriplex hastata* subsp. *patula*, *Atriplex hastata* var. *patula*, *Atriplex hastifolia*, *Atriplex macrodira*, *Atriplex nemorensis*, *A. subsp. amana*, *A. subsp. producta*, *A. var. angustifolia*, *A. var. littoralis*, *A. var. producta*, *Atriplex polymorpha*, *Atriplex procumbens*, *Atriplex recta*, *Atriplex salina*, *Atriplex virgata*, *Chenopodium zosterifolium*

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Pochází z Euroasie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 1 (i 1,2)m. Vytváří několik vzpřímených větvených stonků. Zpravidla střídavé listy mají světlezelenou barvu, kosočtvercovité až 3úhlé, spodní mají délku 3 - 10 (i 12)cm a šířku 1 - 5cm a horní jsou kopinaté až čárkovité. Kvete v zelených lichoklasech a klubičkách s 2ma vejčitěkosníkovitými listeny. Plodem je nažka, semena jsou tmavěhnědá nebo černá s průměrem 1 - 2,5mm.

Roste při okrajích cest, v okopaninách, skládkách a jiných neudržovaných plochách. Vyhovují mu dusíkaté vlhké hlinité půdy.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>