

Atriplex tatarica (Lebeda tatarská)

synonyma: *Atriplex arazdajanica*, *Atriplex campestris*, *Atriplex diffusa*, *Atriplex graeca*, *Atriplex incisa*, *Atriplex lehmanniana*, *Atriplex multicolora*, *Atriplex olivieri*, *Atriplex pruinosa*, *Atriplex rosea* var. *subintegra*, *A. subsp. tornabenei*, *Atriplex tornabenei*, *Atriplex tornabenei* var. *pedunculata*, *Atriplex veneta*, *Chenopodium tataricum*, *Schizotheca tatarica*, *Teutliopsis tatarica*

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Connecticut, Florida, Írán, Itálie, Jižní Amerika, Katalánsko, Kazachstán, New Jersey, New York, Pákistán, Palestina, Pamír, Pennsylvania, Polsko, Střední Evropa, Wisconsin, Z Himálaj

Roste od jižní a střední Evropy po střední Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,3 - 0,8 (i 1,5)m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý a bohatě větvený. Listy jsou střídavé, laločnatě zubaté, 3úhlé až kopinaté nebo kulaté, špičaté nebo zakulacené, dlouhé do 6cm, široké 3cm a dlouze řapíkaté. Květenstvím je hrozen z krátkých klásků nebo lat. Plodem je nažka, semena jsou červená průměru 1,5mm nebo hnědá průměru 1,5 - 2,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *pamirica*/*A. pamirica* - jednoletka; stonek od báze větvený; výška do 25 (i 35)cm; povrch ochlupený; listy střídavé, řapíkaté, vejčité, zubaté; květenství klasnaté; semena plochá, hnědá a průměru 1 - 2mm

Vyhovují ji okraje cest.

<https://www.rostliny.net/>