

Barbarea verna

synonyma: *Barbarea australis*, *Barbarea brevistyla*, *Barbarea erysimoides*, *Barbarea longisiliqua*, *Barbarea patula*, *Barbarea praecox*, *Campe praecox*, *Campe verna*, *Crucifera praecox*, *Erysimum praecox*, *Erysimum tenuifolium*, *Erysimum vernum*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Montana, New Jersey, New York, Newfoundland, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Virginie, Washington, Západní Virginie

Pochází z jihozápadu Evropy. Patří mezi dvouletky. Dorůstá výšky (0,07 -) 0,1 - 0,2 (i 1)m. Listy se mohou používat pro přípravu salátů nebo jako náhražka špenátu, bazální jsou dlouhé (1,3 -) 5 - 15cm, tvoří je (2 -) 6 - 7 párů segmentů délky 1,2 - 2,8cm a šířky 1 - 2,5cm.. Kvete žlutými květy v hroznu, kališní lístky mají délku 3 - 4mm a korunní lístky jsou dlouhé 6 - 7mm. Plodem je šešule délky 6 - 7,5cm, šířky 2mm a obsahuje semena délky 1,8 - 2mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - panašované listy

<https://www.rostliny.net/>