

Calamintha nepeta (Marulka šantovitá)

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Georgia, J Evropa, Kentucky, Maryland, Mississippi, Německo, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Střední střeozemí, Tennessee, Virginie

Roste v jižní Evropě, severní Africe a západní Asii v podobě keře s bylinnými zakončeními. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 50 (i 70)cm. Listy jsou vejčité, zubaté, na okraji ochlupené, zelené, dlouhé 1,7 - 4,2cm, široké 0,9 - 3cm, řapíky dlouhé 0,6 - 1,4cm a vydávají vůni po mátě. Kvete v lichopřeslenu modrorůžovými květy v 2 - 14tičetném květenství, kalich je dlouhý (3 -) 5 - 7 (i 8)mm, koruna má velikost 0,6 - 1,5cm, cípy dolního pysku jsou dlouhé 1 - 2mm a jsou krátce ochlupené a v ústí trubky je prstenec chlupů. Využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. glandulosa (Marulka šantovitá žláznatá) - listy celokrajné, max. velmi mělce vroubkované, max. s 5ti páry zubů; kalich dlouze chlupatý, žlásky jsou prakticky všechny přisedlé, cípy horního pysku jsou dlouhé 0,5 - 1mm, široce 3úhlé

- 'Blue Cloud'

- 'White Cloud'

- subsp. nepeta (Marulka šantovitá pravá) - listy mělce vroubkované s 5 - 9 páry zubů; více květů, kalich pouze řídce ochlupený, mnoho přisedlých i stopkatých žlázek, cípy horního pysku dlouhé 0,7 - 1,5mm, 3úhlé

- 'Lila Riese' - výška 50cm

Vyhovuje jí plné slunce nebo polostín a dále propustná půda. Je mrazuvzdorná do -28°C.

<https://www.rostliny.net/>