

Einadia

čeleď: Chenopodiaceae

Roste jako bylina nebo dřevitá trvalka. Listy jsou vstřícné nebo střídavé, čárkovité až široce šípovité. Květenstvím je hrozen nebo lata, vlastní květy jsou drobné, přisedlé nebo krátce stopkaté a seskupené ve svazečcích. Semena mají čočkovitý tvar. Nejznámějším druhem je *E. nutans*.

Einadia allanii

Einadia hastata

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě kulovitěho polokeře o velikosti do 0,5 (i 1)m. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, široce šípovité, zakulacené, mírně dužnaté, dlouhé i široké 0,5 - 1,5cm a na spodní straně mírně pomoučené. Květenstvím je lata,. Semena jsou černá a v průměru mají 1,5mm.

Einadia nutans

oblasti: Izrael, Katalánsko

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *eremaea*
- subsp. *linifolia*
- subsp. *nutans*
- subsp. *oxycarpa*

Einadia polygonoides

Einadia triandra

Einadia trigonos

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1767>

<https://www.rostliny.net/>