

Centaurium erythraea (Zeměžluč okolíkatá)

synonyma: *Centaurella dichotoma*, *Centaurium capitatum*, *Centaurium corymbosum*, *C. subsp. austriacum*, *C. var. capitatum*, *C. var. fasciculare*, *C. var. laxum*, *C. var. masclansii*, *C. var. subcapitatum*, *C. var. sublitorale*, *Centaurium latifolium*, *Centaurium lomae*, *Centaurium minus*, *Centaurium minus subsp. austriacum*, *Centaurium minus var. austriacum*, *Centaurium minus var. transiens*, *Centaurium umbellatum*, *Centaurium umbellatum f. album*, *Centaurium umbellatum subsp. austriacum*, *Chironia centaurium*, *Chironia centaurium var. fascicularis*, *Erythraea capitata*, *Erythraea centaurium*, *Erythraea centaurium f. itatiaensis*, *Erythraea centaurium var. acutiflorum*, *Erythraea centaurium var. laxum*, *Erythraea centaurium var. subcapitatum*, *Erythraea centaurium var. sublitorale*, *Erythraea centaurium var. transiens*, *Erythraea corymbosa*, *Erythraea germanica*, *Erythraea latifolia*, *Erythraea lomae*, *Erythraea rhodensis*, *Erythraea shuttleworthiana*, *Erythraea vulgaris*, *Gentiana centaurium*, *Gentiana gerardii*, *Gentiana palustris*

čeleď: Gentianaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Arménie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Moldávie, Německo, New York, Nizozemí, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Z Rusko

Roste v Evropě, západní Asii a v severní Africe. Patří mezi jednoletky. Na vzpřímeném stonku dorůstá výšky 10 - 40 (i 60)cm. Lodyha má 4hranný průřez. V přízemí vytváří malou listovou růžici. Listy mají obkopinatý až obvejčitý tvar, vyrůstají vstřícně a mají zelenou barvu. Mají 3 - 5 žilek. Kvete světlérůžovými květy o průměru 1cm se 4 - 5ti okvětními lístky ve staženém vidlanovitém vrcholíku. Plodem je válcovitá tobolka. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *apertum*
- subsp. *bernardii*
- subsp. *enclusense*
- subsp. *erythraea* (Zeměžluč okolíkatá pravá)
- subsp. *grandiflorum/C. grandiflorum*
- subsp. *limoniiforme*
- subsp. *majus*
- subsp. *rhodense*
- subsp. *rumelicum*
- subsp. *suffruticosum*
- subsp. *turicum*

Vyhovuje ji mírně sušší půda bohatá na minerály, plné slunce a travnatá otevřená plocha, paseky, okraje lesů, atp.

Množí se semeny.