

Chelidonium majus (Vlaštovičník větší)

čeleď: Papaveraceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Francie, Georgia, Gruzie, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, JZ Rusko, Katalánsko, Kentucky, Korsika, Krym, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Roste ve středozemí jako trvalka, ale roste i jinde v Evropě a v západní Asii. Dorůstá výšky 0,3 - 0,9 (i 1,2)m na vzpřímené větvené chlupaté lodyze. Listy jsou lichozpeřené, měkké, dlouhé do 30cm, vlastní lístky jsou vejčité s laločnatým či vroubkovaným okrajem, vrcholový lístek je 3laločný. Kvete žlutými 1 - 2cm květy tvořenými 4mi korunními lístky v chudých okolících. Plodem je tobolka obsahující malá a černá semena. Při poranění stonku nebo řapíku listů roní okrově zbarvenou jedovatou tekutinu. Využívá se v léčitelství, např. proti bradavicím. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *asiaticum*
- 'Flore Pleno' - květy plnokvěté
- var. *laciniatum*

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, okraj lesů, úhory, okraje cest a vlhká výživná půda bohatá na dusík.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>