

Chenopodium ambrosioides (Merlík vonný)

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Baleáry, Belgie, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Moldávie, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Srbsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Jižní Ameriky. Patří mezi jednoletky nebo krátce žijící trvalky. Dorůstá výšky 0,8 (i 1,5)m. Lodyha je vzpřímená, dlouze vystoupavě větvená a nepravidelně ochlupená. Lodyžní listy jsou v kopinaté až eliptické, horní části jsou peřenolaločné až peřenoklané, stejně jako listeny, špičaté, dlouhé (5 -) 6 - 10cm, přisedlé a řapíky jsou dlouhé 1cm. Kvete v husté latě složené z nahloučňených klubíček, vnitřní listeny čárkovité, kopinaté nebo úzce vejčité, vlastní květy jsou přisedlé, vrcholové oboupohlavné, hluboce 5tilaločné. Semena jsou hnědá a o průměru 0,6 - 0,8mm. Je výrazně aromatický. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. anthelminticum

<https://www.rostliny.net/>