

Chenopodium foliosum (Merlík listnatý)

synonyma: Blitum korshinskyi, Blitum virgatum, Chenopodium blitum, Chenopodium korshinskyi, Chenopodium virgatum, Monocarpus foliosus, Morocarpus foliosus

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Afganistán, Afrika, Alberta, Altaj, Andalusie, Bhútán, Himálaj, Idaho, Írán, Itálie, Jižní Dakota, JV Evropa, Kalifornie, Karákóram, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kolorado, Kypr, Maine, Massachusetts, Nebraska, Německo, Nevada, New York, Nové Mexiko, Oregon, Pákistán, Palestina, Pamír, Severní Dakota, Slovensko, Švýcarsko, Tádžikistán, Čína, Česká republika, Turecko, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Pochází ze subtropického pásma Euroasie. Patří mezi jednoletky (i krátce žijící trvalky). Dorůstá výšky (15 -) 50 - 60 (i 90). Stonky jsou žlutavé až červené, vzpřímené až vystoupavé a větvené zejména uprostřed. Listy jsou střídavé, zelené, občas červené, 3úhlé, špičaté, hrálovité s nepravidelně vykrajovaným laločnatým okrajem, přízemní jsou dlouhé (3 -) 6 - 9 (i 12)cm, občas širší než delší, lodyžní široce 3úhlé, s dlouhé 1,5cm, široké 2cm, báze prakticky srdčitá až uťatá, řapíky dlouhé do 1,5cm a horní jsou zpravidla užší a na bázi uťaté. Květenství je kulovité, kompaktní, průměru do 1cm, listeny kopinaté, vlastní květy jsou obouohlavné nebo samičí, červenozelené, korunní lístky z části srostlé a dužnaté. Plodem je nažka, semena jsou eliptická dlouhá 0,8 - 1mm a široká 0,7 - 0,8mm.

Vyhovují mu okraje cest, sutě a rumiště.

<https://www.rostliny.net/>