

Chenopodium glaucum (Merlík sivý)

synonyma: *Agathophytum glaucum*, *Blitum glaucum*, *Botrys glauca*, *Chenopodium ambiguum*, *Chenopodium ambiguum* var. *majus*, *Chenopodium ambiguum* var. *minus*, *C. f. minus*, *C. subsp. ambiguum*, *C. subsp. marlothianum*, *C. var. ambiguum*, *C. var. divaricatum*, *C. var. littorale*, *Chenopodium nudiflorum*, *Chenopodium pallidum*, *Chenopodium wolffii*, *Orthospermum glaucum*, *Orthosporum glaucum*

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Alabama, Aljaška, Altaj, Andalusie, Austrálie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, J Afrika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pákistán, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Švýcarsko, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v mírném pásmu severní polokoule jako jednoletka, jinde byl zavlečen. Dorůstá výšky 0,05 - 0,6 (i 1,2)m. Lodyha je vzpřímená, vystoupavá nebo pléhavá, rozvětvená už od země. Listy jsou střídavé, eliptické, kopinaté nebo vejčité s vroubkovatě pilovým mírně podvinutým okrajem, 2 - 5ti laloky, dlouhé (0,5 -) 1 - 3 (i 4,5)cm a řapíkem délky do 1,5cm. Kvete v lichoklasech v horní části lodyhy oboupohlavnými žlutozelenými kvítky se 3 - 4mi korunními lístky. Plodem je nažka průměru 0,65 - 0,8mm, semena mají černou až tmavěhnědou barvu a délku 0,9 - 1mm.

Vyhovují mu vyschlá dna vodních ploch, komposty nebo suchá vodní koryta.

<https://www.rostliny.net/>