

## Chenopodium opulifolium (Merlík kalinolistý)

synonyma: Anserina opulifolia, Chenopodium album f. viride, Chenopodium album subsp. opulifolium, Chenopodium album var. opulifolium, Chenopodium album var. viride, Chenopodium opulifolium, C. subsp. orientale, C. subsp. ugandae, Chenopodium triangulare, Chenopodium ugandae

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Delaware, Egypt, Francie, Illinois, Indiana, Itálie, Izrael, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Lotyšsko, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Missouri, Moldávie, Německo, New Jersey, New York, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Pochází zřejmě ze středozeší. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 0,7 (i 1)m. Vytváří prutovitě větvenou zelenou lodyhu s pomoučeným povrchem. Listy mají kosočtvercový laločnatý tvar o stejně dlouhých hranách, koncová 1/2 je mělce pilovitá až laločnatá, délka je 0,6 - 3cm. Semena jsou černá velikosti 1,1 - 1,5mm.

Vyhovují mu ruderalní místa.

<https://www.rostliny.net/>