

Reichardia tingitana

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Austrálie, Havajské ostrovy, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Makaronésie, Středozeemí, SV Afrika, SZ Indie

Pochází ze středozeemí, Makaronésie, severovýchodní Afriky a jihozápadní Asie. Zavlččená byla do Austrálie a Tichomoří. Roste jako jednoletka nebo krátkověká trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 35 (i 60)cm. Stonek je přímý. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou obkopinaté, zpravidla zpeřené, dužnaté, mohou být ochlupené, šedozeelené, zubaté, dlouhé 2 - 14cm, široké 0,7 - 4cm, lodyžní jsou zpravidla zakrnělé, přisedlé a kopinaté. Květenstvím je terminální samostatný úbor, zákrov má délku 0,9 - 1,5cm, vnější zákrovní listeny jsou vejčité, vnitřní kopinaté, okvětní lístky žluté, zpravidla s růžovofialovou bází. Plodem je nažka délky 1,5 - 2,2mm s chmýrem délky 7 - 8,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. mauritii
- var. pinnatifida

Vyhovují mu duny a jiná písčité místa.

<https://www.rostliny.net/>