

Coriandrum sativum (Koriandr setý)

synonyma: *Bifora loureiroi*, *Coriandropsis syriaca*, *Coriandrum globosum*, *Coriandrum majus*, *C. subsp. asiaticum*, *C. subsp. indicum*, *C. subsp. vavilovii*, *C. var. afghanicum*, *C. var. africanum*, *C. var. anatomicum*, *C. var. arabicum*, *C. var. asiaticum*, *C. var. indicum*, *C. var. microcarpum*, *C. var. pygmaeum*, *C. var. vavilovii*, *Selinum coriandrum*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Arizona, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Delaware, Egypt, Florida, Gruzie, Havajské ostrovy, Illinois, Írán, Izrael, Jižní Dakota, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Libanon, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portugalsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Střední středozemí, Tennessee, Texas, V Středozemí, Virginie, Washington, Wyoming

Roste v jižní Evropě, severní Africe, Severní Americe a jihozápadní Asii jako jednoletka a pochází asi z východního Středozemí. Dorůstá výšky až 0,4 - 0,7 (i 1)m a šířky 20cm. Lodyha je větvená. Listy jsou několikanásobně zpeřené, převážně čárkovité, zubaté, ale díky jejich vysoké variabilitě i širší. Vydávají nepříjemný zápach. Kvete v deštníkovém okolíku složeném z (3 -) 5 - 6ti okolíčků s bílými naružovělými květy, kališní zuby jsou nestejné, korunní lístky jsou růžovobílé, vnější větší s 2ma laloky. Plodem je kulovitá 2nažka délky 4mm s málo zřetelnými žebry. Semena se používají jako koření. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bengal Giant'
- 'Hrubčický'

Vyhovuje mu plné slunce a lehčí propustná půda.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>