

Wigandia urens

čeleď: Namaceae

oblasti: Austrálie, Ekvádor, Francie, Itálie, J Mexiko, Kalifornie, Karibik, Katalánsko, Kolumbie, Kostarika, Peru, Sicílie, Venezuela

Roste na severu Jižní Ameriky v podobě vzpřímeného větveného polokeře. Dorůstá výšky do 4 - 5 (i 7)m. Povrch je bíle ochlupený, občas i žláznatě. Listy jsou střídavé, vejčité, tupé až mírně špičaté, asymetricky 2x pilovité, oboustranně ochlupené, dlouhé (5 -) 8 - 42 (i 60)cm, široké (3 -) 4 - 19 (i 42)cm, báze srdčitá až uťatá, spodní strana ochlupená a žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek. Květenství je prakticky přisedlé, tvoří jej hustá terminální lata nebo vrcholík, koncové větve jsou ve vijanech, kalich je vytrvávající, laloky má prakticky stejné, úzce kopinaté, na bázi srostlé, dlouhé do 1cm, koruna zvonkovitá, světlefialové až růžovofialová, v jícnu světlejší a dlouhá do 1,8 (i 2)cm. Plodem je mírně kuželovitá ochlupená tobolka obsahující mnoho malých hnědých semen. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *caracasana*/W. *caracasana*/var. *calycina*/var. *macrophylla*/var. *viscosa*/W. *kunthii* var. *intermedia*/W. *kunthii* var. *viscosa*/W. *macrophylla*/W. *scorpioides* - Mexiko až Kostarika, Kolumbie a Venezuela; listy a kmínky holé

<https://www.rostliny.net/>