

Cynara cardunculus (Artyčok kardový)

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Černá Hora, Francie, Itálie, Jižní Amerika, Kalifornie, Katalánsko, Libye, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Německo, Oregon, Portugalsko, Sardínie, Slovinsko, Srbsko, Střední střeozemí, Tunisko, Turecko, Washington

Roste na západě střeozemí jako dvouletka až trvalka, ale zavlečený byl i do Severní i Jižní Ameriky. Dorůstá výšky 0,9 - 1,5 (i 2,5)m. Pod zemí vytváří úzký vřetenovitý kořen. V 1. roce vytváří pouze přízemní růžici o průměru až 1,2m z velkých hluboce vykrojených peřenosečných až peřenodílných listů dlouhých až 40cm, spodní stranu mají bíle plstnatou. Jsou mohutnější než u *C. scolymus* a konzumují se jejich dužnaté řapíky. 2. rokem vyrůstá lodyha a květy. Kvete na 1,5 - 2m stoncích modrofialovými bodlákově vyhlížejícími květy v ostnitých úborech o průměru 5 - 8cm a délky 4,5 - 6cm. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *altilis* - krátké ostny na listech, silné řapíky
- 'Blanc amélioré' - hladké řapíky bez ostnů
- 'Cardon Plein Inerme' - široké řapíky bez ostnů
- subsp. *cardunculus* (Artyčok kardový pravý)
- 'De Pulvis'
- var. *ferocissima* - Madeira
- subsp. *flavescens* - výška 0,4 - 1m; květenství průměru 5 - 8cm, délky 4,5 - 6cm; nažky dlouhé 6 - 7mm s chmýrem délky 2,5 - 3,5cm
- var. *inermis* - bez ostnů
- 'Large Smooth' - hladké řapíky bez ostnů
- subsp. *zingaroensis* - endemit Itálie

Potřebuje teplo, plné slunce a hlinitou půdu bohatou na živiny. Odolává mrazu do -10 (i -18)°C, na zimu je potřeba trsy chránit např. kupou listů.

Množí se odkopky nebo semeny, které klíčí při teplotě 21 - 26°C.

<https://www.rostliny.net/>