

# Raphanus raphanistrum (Ředkev ohnice)

synonyma: Raphanus arvense, Raphanus segetum

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Baleáry, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Labrador, Louisiana, Maine, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovinsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Asie, možná ze středozemí. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1,5)m. Kořen je tenký, vretenatý. Lodyha je rovná, větvená. Listy mají kopinatý nebo lyrovitý tvar s až 4mi úkrojkami, délku 7 - 28cm a šířku 2,5 - 7cm. Kvete bílými nebo nažloutlými květy s fialovými žilkami a se 4mi korunními lístky rozpínající se do široka na konci úzkého trubkovitého hrdla, celkový průměr dosahuje 1,5 - 2cm, kališní lístky jsou dlouhé 0,7 - 1cm, korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2,2cm a jsou seskupeny do chocholíku. Plodem je zaškrcovaný 3 - 8cm dlouhý struk. Semena mají červenohnědou barvu a délku 2mm. Jediná rostlina jich dokáže vyprodukovať až 2500ks a tím se řadí mezi plevel. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. landra
- subsp. maritimus
- subsp. raphanistrum (Ředkev ohnice pravá)
- subsp. rostratus
- subsp. sativus

Vyhovují ji hlinitopísčité půdy chudší na živiny s kyselým pH.

<https://www.rostliny.net/>