

## Dodonaea (Dodonea)

čeleď: Sapindaceae

Rod je pojmenován po Rembertovi Dodoensovi. Roste od teplých oblastí mírného pásma po tropy Ameriky, Asie a Austrálie v podobě stálezelených zpravidla dvoudomých keřů nebo stromů o výšce 1 - 5m. Listy má střídavé, jednoduché nebo zpeřené. Kvete v krátkých hroznech a vlastní květy jsou drobné. Plodem jsou bohaté tobolky často se 2 - 3 křidélky ve útvarech podobných chmelovým šišticím.

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín a dobře propustné půdě bohaté na živiny.

Množí se semeny nebo řízky.

### Dodonaea adenophora

### Dodonaea amblyophylla

### Dodonaea angustifolia

oblasti: Arabský poloostrov, Austrálie, J Afrika, Nový Zéland

Roste od jižní Afriky po Arábii, ale také v Austrálii a na Novém Zélandě. Roste v podobě keře nebo nízkého stromu. Plodem je tobolka se 3mi křidélky. Extrakty z ní se používají v medicíně.

Vyhovují ji skalnatá místa nebo písčité půdy.

### Dodonaea angustissima

### Dodonaea aptera

oblasti: Západní Austrálie

Patří mezi endemity západní Austrálie. Nepřerůstá výšku 3,5m.

### Dodonaea attenuata

### Dodonaea baueri

### Dodonaea biloba

### Dodonaea boroniifolia

Roste v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou tmavězelené, složené z lepivých lístků. Kvete drobnými květy. Plodem je 4křídlá červená tobolka.

Dobře snáší sucho.

Dodonaea bursariifolia

Dodonaea caespitosa

Dodonaea camfieldii

Dodonaea ceratocarpa

Dodonaea concinna

Dodonaea coriacea

Dodonaea cuneata

Dodonaea divaricata

Dodonaea ericifolia

Dodonaea ericoides

Dodonaea falcata

Dodonaea filifolia

Dodonaea filiformis

Dodonaea glandulosa

Dodonaea hackettiana

Dodonaea heteromorpha

Dodonaea hexandra

Dodonaea hirsuta

Dodonaea humifusa

Dodonaea humilis

Dodonaea inaequifolia

Dodonaea intricata

Dodonaea lanceolata

Dodonaea larreoides

Dodonaea lobulata

Dodonaea macrossanii

Dodonaea madagascariensis

Dodonaea megazyga

Dodonaea microzyga

Dodonaea multijuga

Dodonaea oxyptera

Dodonaea pachyneura

Dodonaea peduncularis

## Dodonaea petiolaris

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 5)m.

Vyhovují mu písčité půdy.

## Dodonaea physocarpa

## Dodonaea pinifolia

## Dodonaea pinnata

## Dodonaea platyptera

## Dodonaea polyandra

## Dodonaea polyzyga

## Dodonaea procumbens

## Dodonaea ptarmicifolia

## Dodonaea rhombifolia

## Dodonaea rigida

## Dodonaea rupicola

## Dodonaea serratifolia

## Dodonaea sinuolata

## Dodonaea spatulata

## Dodonaea stenophylla

## Dodonaea stenozyga

## Dodonaea subglandulifera

## Dodonaea tenuifolia

## Dodonaea tepperi

## Dodonaea triangularis

## Dodonaea trifida

## Dodonaea triquetra

oblasti: V Austrálie

Pochází z východní Austrálie. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 3m. Listy má eliptické, dlouhé 5 - 12cm, široké 1 - 5cm, barvy šedozelené. Kvete v hroznech. Plodem je tobolka s křídélky velikosti 1 - 1,5cm.

## Dodonaea truncatiales

## Dodonaea uncinata

## Dodonaea vestita

## Dodonaea viscosa (Dodonaea lepivá)

oblasti: Arizona, Austrálie, Čína, Egypt, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Írán, Kalifornie, Kypr, Libye, Pákistán, Portoriko, Srí Lanka, Střední středozemí, Tropická Afrika

Roste v subtropech a jiných teplých oblastech Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie a Nového Zélandu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 5 (i 9)m. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou střídavé, jednoduché, eliptické, obkopinaté až lžičkovité nebo čárkovité, zašpičatělé, přisedlé, zvlněné, mírně lepivé, bledozelené, dlouhé (3 -) 4 - 7,5 (i 9)cm a široké (0,5 -) 1 - 1,5 (i 2)cm. Květenstvím je hrozen délky 2,5 - 3cm, vlastní květy jsou žluté až červenooranžové nebo nazelenalé na 4 - 8mm stopce, kališních lístků je 3 - 5ks, jsou vejčité, ochlupené a dlouhé 3mm. Plodenství je hroznovité, hnědé, růžové nebo růžovofialové, vlastním plodem je světlehnědá 2 - 4komorová tobolka délky 1,2 - 1,4 (i 1,5)cm, šířky 1,5 - 1,9cm se (2 -) 3 (i 4)mí křídly a obsahuje kulovitá černá semena délky 4mm. Dřevo je velmi bohaté na pryskyřici a díky tomu je i lepkavé. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. angustifolia
- subsp. angustissima
- subsp. burmanniana
- subsp. cuneata
- subsp. mucronata
- 'Purpurea' - kulatý habitus; listy bronzové; tobolky růžovofialovočervené
- subsp. spatulata
- subsp. viscosa (Dodonaea lepivá pravá)

Není mrazuvzdorná.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?130>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Dodonka>

<https://www.rostliny.net/>