

Dodonaea viscosa (Dodonaea lepivá)

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Arizona, Austrálie, Čína, Egypt, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Írán, Kalifornie, Kypr, Libye, Pákistán, Portoriko, Srí Lanka, Střední střeozemí, Tropická Afrika

Roste v subtropích a jiných teplých oblastech Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie a Nového Zélandu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 5 (i 9)m. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou střídavé, jednoduché, eliptické, obkopynaté až lžičkovité nebo čárkovité, zašpičatělé, přisedlé, zvlněné, mírně lepivé, bledězelené, dlouhé (3 -) 4 - 7,5 (i 9)cm a široké (0,5 -) 1 - 1,5 (i 2)cm. Květenstvím je hrozen délky 2,5 - 3cm, vlastní květy jsou žluté až červenooranžové nebo nazelenalé na 4 - 8mm stopce, kališních lístků je 3 - 5ks, jsou vejčité, ochlupené a dlouhé 3mm. Plodenství je hroznovité, hnědé, růžové nebo růžovofialové, vlastním plodem je světlehnědá 2 - 4komorová tobolka délky 1,2 - 1,4 (i 1,5)cm, šířky 1,5 - 1,9cm se (2 -) 3 (i 4)mí křídly a obsahuje kulovitá černá semena délky 4mm. Dřevo je velmi bohaté na pryskyřici a díky tomu je i lepkavé. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. angustifolia
- subsp. angustissima
- subsp. burmanniana
- subsp. cuneata
- subsp. mucronata
- 'Purpurea' - kulatý habitus; listy bronzové; tobolky růžovofialovočervené
- subsp. spatulata
- subsp. viscosa (Dodonaea lepivá pravá)

Není mrazuvzdorná.

<https://www.rostliny.net/>