

Eruca vesicaria

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alberta, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Illinois, Iowa, Itálie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Texas, Utah, Vermont, Washington, Wyoming, Z Středozeří, Západní Virginie

Pochází ze západního středozeří. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,5 - 0,7 (i 1)m. Listy má peřenoklané se zubatým okrajem s 5 - 7ti páry segmentů, dlouhé 3 - 35cm a široké 0,5 - 6cm. Květenstvím je chocholík, vlastní květy mají v průměru 2 - 4cm, bílou barvu, kališní lístky jsou dlouhé 0,7 - 1,2cm a 4 korunní lístky délky 1,5 - 2,2cm se zeleným žilkováním. Plodem je šešule délky (1 -) 1,5 - 2 (i 2,5)cm, šířky 2 - 5mm a obsahující několik jedlých semen délky 1,5 - 2mm a šířky 1 - 1,2mm. Listy se používají k přípravě salátů. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *lativalvis*
- subsp. *sativa* - kališní lístky dlouhé 0,7 - 1,2cm a široké 2mm
- subsp. *vesicaria* - kališní lístky dlouhé 1 - 1,2cm, široké 3 - 4mm

Snese pouze mírné přizemní mrazíky do -4°C. Potřebuje sucho a půdu bohatou na dusík, aby rychleji rostla. Jinak totiž zhořkne. Je odolná na sucho.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>