

Phymatosorus scolopendria

synonyma: *Chrysopteris longipes*, *Chrysopteris peltidea*, *Chrysopteris phymatodes*, *Chrysopteris terminalis*, *Drynaria longipes*, *Drynaria phymatodes*, *Drynaria vulgaris*, *Microsorium alternifolium*, *Microsorium scolopendria*, *Phymatodes banerjiana*, *Phymatodes longipes*, *Phymatodes peltidea*, *Phymatodes phymatodes*, *Phymatodes scolopendria*, *Phymatodes terminalis*, *Phymatodes vulgaris*, *Phymatosorus banerjianus*, *Pleopeltis schneideri*, *Polypodium alternifolium*, *Polypodium fuentesii*, *Polypodium longipes*, *Polypodium madagascariense*, *Polypodium peltideum*, *Polypodium phymatodes*, *Polypodium scolopendria*

čeleď: Polypodiaceae

oblasti: Angola, Benin, Borneo, Demokratická Republika Kongo (Zair), Etiopie, Filipíny, Florida, Gabon (Gabun), Ghana, Gilbert Islands, Hainan, Havajské ostrovy, Howland-Baker Island, Indie, Japonsko, Jáva, Jiangxi, Jižní Súdán, Kambodža, Kamerun, Kapsko, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Liniové ostrovy, Madagaskar, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundry, Marshallovy ostrovy, Mosambik, Myanmar (Barma), Nauru, Nigérie, Nová Kaledonie, Papua-Nová Guinea, Pobřeží Slonoviny, Portoriko, Queensland, Rovníková Guinea, Santa Cruz Island, Sierra Leone, Srí Lanka, Středoafriická Republika, Súdán, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Tanzánie, Thajsko, Togo, Transvaal, Tuamotu, Tuvalu, Uganda, Vietnam, Zimbabwe

Roste v tropické a subtropické Africe, Asii, Austrálii a Tichém oceánu. Vytváří plazivý oddenek. Listy jsou široce jazykovité, bledě zelené a hluboce peřenosečné.

<https://www.rostliny.net/>