

# Abelmoschus manihot

synonyma: Hibiscus manihot

čeleď: Malvaceae

oblasti: Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Japonsko, Jižní Amerika, Nová Guinea, Omán, Pákistán, S Austrálie, Střední Amerika, Thajsko, Tichý oceán, Z Afrika

Pravděpodobně pochází z východní Asie, ale roste prakticky v teplých oblastech všech kontinentů. Může být jednoletkou i trvalkou. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 2,8)m. Povrch je ostře ochlupený. Palisty jsou úzce kopinaté, dlouhé 1 - 1,5cm. Listy jsou střídavé, jedlé, mají oválný tvar (dlanitosečný) s 5 - 9 laloky, průměr (5 -) 15 - 30cm, úkrojky jsou kopinaté, dlouhé 8 - 18cm, řídce ochlupené, pilovité, báze srdčitá a řapík je dlouhý (3 -) 6 - 18 (i 25)cm. Kvete samostatnými světležlutými (i nafialovělými) květy až do zámru v paždí koncových listů na (1 -) 1,5 - 4 (i 5)cm stopce (v době plodu až 7cm), má 4 - 5 listeny vejčitékopinatého tvaru délky (1 -) 1,5 - 2,5 (i 3)cm, šířky 0,5 - 1cm, kalich je toulcovitý s 5ti malými zuby, dlouhý 2 - 3cm, koruna má průměr 7 - 10cm, žlutou barvu, hrdlo růžovofialové, korunní lístky bývají obvejčité, dlouhé 3,5 - 8cm a široké 3 - 6cm. Plodem je mírně vejčitá ochlupená tobolka délky (3,5 -) 4 - 5 (i 8)cm, šířky 2 - 2,5cm a obsahuje černá ledvinitá semena velikosti 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *pungens*/A. *pungens* - Indie, Pákistán, Čína, Filipíny a severní Austrálie
- subsp. *tetraphyllus*

Potřebuje plné slunce a vlhčí půdu bohatou na živiny, okraje cest, polí, trávníky, atp.

<https://www.rostliny.net/>