

Lycopus europaeus (Karbinec evropský)

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Delaware, Gruzie, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kazachstán, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Německo, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Severní Karolína, Švýcarsko, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Evropě a Asii jako trvalka. Dorůstá výšky 0,2 - 0,8 (i 1)m. Lodyha se čtvercovým průřezem je dutá. Vstřícné párové křížmostojné listy jsou peřenoklané až peřenodílné, obrysem mírně vejčité, hrubě zubaté, dlouhé (2 -) 3 - 6 (i 8)cm a široké (1 -) 2 - 4 (i 5)cm. Kvete v paždí listů drobnými bílými kvítky v přeslenech v paždí listů, listeny jsou vejčité, max. délky kalicha, kalich je zvonkovitý, délky (2,5 -) 3 (i 4,5)mm, kališní cípy jsou delší než kališní trubka, koruna je bílá s červenými skvrnami a koruna má délku 2,5 - 4mm. Plodem je tvrdka délky 1,1mm a šířky 1mm. Využívá se v léčitelství. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. mollis

Vyhovují mu vlhká místa, olšiny, lužní lesy, okraje toků, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>