

Lactuca saligna (Locika vrbová)

synonyma: Chondrilla crepoides, Lactuca adulteriana, Lactuca angustifolia, Lactuca caucasica, Lactuca caucasica var. caucasica, Lactuca caucasica var. major, Lactuca caucasica var. minor, Lactuca cracoviensis, Lactuca cyanea, Lactuca salicifolia, L. f. saligna, L. var. runcinata, L. var. ruppiana, L. var. saligna, L. var. wallrothiana, Lactuca spiciformis, Lactuca tommasiniana, Lactuca virgata, Lactuca wallrothii

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maryland, Missouri, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Severní Karolína, Střední středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 60 (i 90)cm. Dolní lodyžní listy jsou peřenosečné, horní střídavé, celistvé, čárkovité a celokrajné. Květenství je prutovité a tvoří je úbory se zákrovem délky 1,4 - 1,6cm a šírkou 2,5 - 3,5mm. Plodem je nažka délky 3,5 - 4mm s chmýrem délky 5 - 6mm, zobánek je 2x delší než tělo nažky. U nás nezvěstný A2.

Vyhovují mu okraje cest, křoviny a narušená místa.

<https://www.rostliny.net/>