

Lactuca viminea (Locika prutnatá)

synonyma: *Chondrilla ramosissima*, *Chondrilla sessiliflora*, *Chondrilla viminea*, *Hieracium vimineum*, *Lactuca chondrilliflora* subsp. *contracta*, *L. f. viminea*, *L. var. intricata*, *L. var. numidica*, *L. var. pomeliana*, *L. var. viminea*, *Phaenixopus vimineus*, *Phaenopus vimineus*, *Prenanthes viminea*, *Scariola viminea*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Andalusie, Arménie, Česká republika, Indie, Irák, Írán, Itálie, Katalánsko, Pákistán, Saudská Arábie, Středozeří, Švýcarsko

Roste ve střední Evropě, středozeří a dále až po Indii jako dvouletka nebo krátkověká trvalka. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,3 - 0,7 (i 1)m. Stonek je větvený, větve jsou bělavé a prutovité. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou peřenosečné až peřenodílné s čárkovitými úkrojky, tuhé, tmavězelené, krátce řapíkaté, dlouhé 4 - 8cm, široké 0,3 - 1cm, lodyžní jsou střídavé, kopinaté, dlouze špičaté, přisedlé, dlouhé 0,5 - 2cm, široké 2 - 4mm a mají přisedlá ouška délky 1 - 2cm. Kvete žlutými květy v úborech délky 0,5 - 1cm, šířky 5mm, seskupených do 4 - 8četného klasu, zákrov je válcovitý, 3 - 4řadý, dlouhý 1,2 - 1,4 (i 2)cm, široký 1,5 - 2,5 (i 3)mm, vnější zákrovní lístky jsou vejčité kopinaté, dlouhé 1,5 - 5mm, široké 1 - 1,5mm, vnitřní jsou úzce podlouhlé, dlouhé 0,8 - 1 (i 1,3)cm, široké 1,5 - 2mm, okvětních lístků je 12 - 14 a jsou bledě žluté. Plodem je nažka se 7 - 9ti rýhami, délky 3,5 - 6mm, šířky 1 - 1,5mm, se zobákem a chmýrem délky (5,5 -) 6 - 7 (i 8,5)mm. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *chondrilliflora* - nažka délky 6,5 - 9mm
- subsp. *ramosissima*
- subsp. *viminea* (Locika prutnatá pravá) - nažka délky (0,8 -) 0,9 - 1,2cm

Vyhovují jí stepi, skalnaté nebo travnaté svahy na slunci.

<https://www.rostliny.net/>