

Pseudoscleropodium purum (Lazovec čistý)

čeleď: Asphodelaceae

oblasti: Asie, Čile, Havajské ostrovy, Island, Jamajka, Makaronésie, Nový Zéland, Severní Amerika, Velká Británie

Roste ve Velké Británii, Islandu, Azorských ostrovech, Madeiře, Kanárských ostrovech, Jamajce, Havajských ostrovech, Čile, Novém Zélandu, Austrálii, Svaté Heleně, Severní Americe a Asii v poléhavých trsech. Lodyžky jsou dvouřadě větvené, dlouhé 5 - 15cm. Žebro je jednoduché, 2ramenné, dosahuje do 1/2 lístku, vlastní lístky jsou dlouhé 2 - 3mm, vyrůstají ve šroubovici a překrývají se, jsou mírně zvrásněné, špička zakulacená a pilovitá. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. adpressum
- f. australe
- f. bouvetii
- f. condensatum
- f. depauperatum
- f. distichum
- f. elatum
- f. glaucescens
- f. molle
- f. nigrescens
- f. obscurum
- f. simplex
- f. turgescens

Vyhovují mu listnaté nebo světlé jehličnaté lesy od nížin po vysokopoložená místa. Půda může být vápnitá, jílovitá nebo písčitá se středním obsahem živin.

<https://www.rostliny.net/>