

Thlaspi caerulescens (Penízek modravý)

synonyma: *Carpoceras griffithianum*, *Crucifera coeruleascens*, *Noccaea brachypetala* subsp. *huteri*, *Noccaea caerulescens*, *Noccaea caerulescens* subsp. *sylvestris*, *Noccaea firmiensis*, *Noccaea occitanica*, *Noccaea occitanica* subsp. *tallonis*, *Thlaspi alpestre*, *Thlaspi alpestre* subsp. *sylvestre*, *Thlaspi ambiguum*, *Thlaspi arenarium*, *Thlaspi arvernense*, *T. subsp. occitanicum*, *T. subsp. sylvestre*, *Thlaspi cochleariforme* subsp. *griffithianum*, *Thlaspi firmiense*, *Thlaspi gaudinianum*, *Thlaspi griffithianum*, *Thlaspi huteri*, *Thlaspi lereschii*, *Thlaspi muretii*, *Thlaspi occitanicum*, *Thlaspi oligospermum*, *Thlaspi perfoliatum* var. *alpestre*, *Thlaspi sylvestre*, *Thlaspi sylvestre* var. *oligospermum*, *Thlaspi tallonis*, *Thlaspi thlaspidioides*, *Thlaspi vogesiacum*, *Thlaspi wendelboi*, *Thlaspidium alpestre*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Z Severní Amerika

Roste na západě Severní Ameriky, ve střední Evropě a v okolí Alp. Patří mezi dvouletky nebo krátcežijící trvalky. Dorůstá výšky 15 - 35cm. Lodyha má červenozelenou barvu. Vytváří přízemní listovou růžici z malých obvejčitých listů. Kvete v hroznech bílými mírně nafialovělými květy. Plodem je srdčitá šešulka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *brachypetalum*/*Noccaea brachypetala*/*Noccaea salisii*
- subsp. *calaminara*
- subsp. *caerulescens*/*Noccaea caerulescens*
- subsp. *tatrense*
- subsp. *virens*/*Noccaea virens*

Vyhovují mu okraje cest a železniční tratě, travnaté stráně, násypy, píčité půdy, vlhčí, bohaté na živiny.

<https://www.rostliny.net/>