

Eremopoa

čeleď: Poaceae

Eremopoa altaica

oblasti: Afganistán, Altaj, Ázád Kašmír, Balúčistán, Chajbar Paštunchwá, Egypt, Gilgit-Baltistán, Himálaj, Írán, Izrael, J Ural, JZ Rusko, Kavkaz, Sinajský poloostrov, Turecko, Xinjiang, Xizang (Tibet)

Roste v Egyptě, evropském Rusku a dál po Tibet jako jednoletka. Dorůstá výšky 5 - 45cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou dlouhé 2 - 10cm a široké 1 - 4mm. Květenstvím je vejčitá lata délky 3 - 20cm, klásky jsou 2 - 6tikvěté a dlouhé 3,5 - 6,5mm. Plodem je nažka délky 0,3 - 0,7 (i 1)mm.

Eremopoa attalica

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku.

Eremopoa capillaris

oblasti: Libanon, Malá Asie (Anatolie), Sýrie

Roste v Turecku, Sýrii a Libanonu.

Eremopoa mardinensis

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku.

Eremopoa persica

oblasti: Afganistán, Balúčistán, Írán, Kavkaz, S Indie, Saudská Arábie, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán

Roste na Kavkaze, Saudské Arábii, Afganistánu, Íránu, Pakistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Indii jako jednoletka. Dorůstá výšky 15 - 75cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou dlouhé 4 - 20cm a široké 2 - 6,5mm. Květenstvím je vejčitá lata délky 27 - 65cm, klásky jsou 3 - 11tikvěté a dlouhé 1,1 - 4,5cm. Plodem je nažka délky 1,4 - 2,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. songarica

- var. persica

<https://www.rostliny.net/>