

Ocimum americanum

synonyma: *Ocimum basilicum* subsp. *americanum*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Afrika, Arabský poloostrov, Austrálie, Himálaj, Kašmír, Malajsie, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Střední Amerika

Roste v Africe, tropické Asii a Americe a Austrálii zpravidla jako trvalka. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 60)cm. Stonek je přímý, bohatě větvený a zpětně ochlupený. Listy jsou vstřícné, eliptické až vejčité, špičaté, drobně pilovité až prakticky celokrajné, dlouhé 1 - 1,7 (i 3)cm, široké 0,5 - 1 (i 1,5)cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky dlouhé 1 - 2cm. Kvete bílými nebo namodralými květy po 6ti ks v oddělených 5 - 16ti 6 - 10tikvětých lichopřeslenech, listeny jsou podlouhlé, dlouhé 2 - 3 (i 4)mm, vlastní květy mají 1,5mm stopku, kalich je zvonkovitý, dlouhý 2 - 2,5 (za plodu až 4)mm, na bázi ochlupený, prostřední cíp horního pysku je kulatý, postranní jsou kratší, 3úhlé, zuby dolního pysku kalicha jsou vejčité kopinaté, osinaté, delší horního, koruna je přímá, bílá, dlouhá 4 - 5mm, trubka je mírně delší kalicha, dolní pysk je vypouklý a celokrajný. Plody jsou vejčité černé jemně tečkované tvrdky délky 1,5mm a šířky 0,8 - 1,3mm. Používá se v medicíně.

Vyhovují ji chráněná místa, okraje cest, potoků atp.

<https://www.rostliny.net/>